

GLOSARIO

UNIDAD 2 “EL ADULTO/ ANCIANO EN EL PERIOPERATORIO”

Cirugía ambulatoria: incluye las operaciones hospitalarias que se realizan durante un mismo día o que tienen una estancia breve en el hospital.

Cirugía de mínima invasión: procedimientos quirúrgicos que utilizan instrumentos especializados insertados en el cuerpo ya sea a través de orificios naturales o mediante pequeñas incisiones.

Consentimiento informado: la decisión autónoma del paciente sobre si se somete a una intervención quirúrgica según la naturaleza del trastorno, las alternativas terapéuticas, los riesgos y los beneficios implicados.

Período perioperatorio: etapa que constituye la experiencia quirúrgica; incluye los períodos preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio de la atención de enfermería.

Período postoperatorio: etapa que comienza con el ingreso del paciente a la unidad de cuidados postanestésicos y termina después de la valoración de seguimiento en la institución clínica o en casa.

Período preoperatorio: etapa desde que se toma la decisión de realizar la intervención quirúrgica hasta el momento en el que el paciente se traslada a la mesa de operaciones.

Período transoperatorio: etapa que comienza con el traslado del paciente a la mesa de operaciones y continúa hasta que se le ingresa a la unidad de cuidados postanestésicos.

Pruebas pre-admisión: pruebas diagnósticas realizadas antes del ingreso al hospital.

Agente anestésico: sustancia, como un compuesto químico o un gas, que se utiliza para inducir la anestesia.

Anestesia: estado de narcosis o depresión intensa del sistema nervioso central generado por fármacos.

Anestesiólogo: médico capacitado para aplicar anestesia y vigilar las condiciones del paciente durante la operación.

Área blanca: zona del quirófano en la que se requiere el empleo de pijama quirúrgico y mascarilla (cubre bocas); incluye el quirófano y las áreas centrales esterilizadas.

Área gris: zona del quirófano en la que se requiere pijama quirúrgico; puede incluir áreas en las que se procesa instrumental quirúrgico.

Área negra: zona del quirófano que se relaciona con otros departamentos; incluye el área de recepción del paciente y el área de espera.

Asepsia quirúrgica: ausencia de microorganismos en el ambiente quirúrgico para reducir el riesgo de infección.

Atención de anestesia vigilada: sedación moderada administrada por un anestesiólogo o personal de enfermería anestesista certificado.

Enfermera o enfermero circulante: personal de enfermería certificado que coordina y documenta la atención del paciente en el quirófano.

Hipertermia maligna: alteración infrecuente y mortal desencadenada por la exposición a la mayoría de los anestésicos; induce aumento drástico y descontrolado del metabolismo oxidativo en el músculo esquelético que puede rebasar la capacidad del cuerpo para suministrar oxígeno, eliminar dióxido de carbono y regular la temperatura corporal; si no se trata, conduce a colapso circulatorio y muerte; con frecuencia, se hereda como enfermedad autosómica dominante.

Instrumentista: personal de enfermería certificado, personal de enfermería clínico certificado o técnico quirúrgico que se lava y viste el atuendo quirúrgico esterilizado, prepara los instrumentos y suministros, y entrega el instrumental al cirujano durante el procedimiento.

Laparoscopia: endoscopio delgado introducido a través de una pequeña incisión en una cavidad o articulación, que usa tecnología de fibra óptica para proyectar imágenes en vivo de las estructuras en un monitor; otras pequeñas incisiones permiten la introducción de instrumentos adicionales para facilitar la cirugía laparoscópica.

Personal de enfermería primer ayudante certificado: miembro del equipo de quirófano cuyas responsabilidades pueden incluir la manipulación de tejido, proporcionar exposición en el campo operatorio, suturar y mantener la hemostasia.

Sedación moderada: antes conocida como sedación consciente, implica la sedación para disminuir el nivel de consciencia sin alterar la capacidad del paciente para mantener abierta la vía aérea y responder a estímulos físicos y órdenes verbales.

Cicatrización de primera intención: proceso de cicatrización en el que los márgenes de la herida se aproximan por técnicas quirúrgicas y se restaura la continuidad tegumentaria sin granulación.

Cicatrización de segunda intención: mecanismo de cicatrización en el que los bordes de la herida no se aproximan por medios quirúrgicos y la continuidad tegumentaria se restaura por el proceso conocido como granulación.

Cicatrización de tercera intención: proceso de cicatrización en el que la aproximación quirúrgica de los bordes de la herida se retrasa y la continuidad tegumentaria se restaura mediante la aposición de áreas de granulación.

Dehiscencia: separación parcial o completa de los bordes de una herida.

Evisceración: protrusión de órganos a través de la incisión quirúrgica.

UCPA de fase I: área designada para la atención inmediata posterior a la operación de pacientes quirúrgicos cuya condición amerita vigilancia estrecha.

UCPA de fase II: área designada para la atención de pacientes quirúrgicos que se trasladaron de la UCPA de fase I porque su estado ya no requiere la vigilancia estrecha que se brinda en esa fase.

UCPA de fase III: área donde el paciente es atendido durante el período postoperatorio mediano a fin de prepararlo para su egreso (alta hospitalaria) de la institución.

Unidad de cuidados postanestésicos (UCPA): área donde se vigilan los pacientes durante el período postoperatorio mientras se recuperan de la anestesia; antes se llamaba sala de recuperación o sala de recuperación postanestésica.